

Ankaferd Proteomix Kullanım Talimatı

Farklı bir kullanım önerilmediyse, aşağıdaki gibi kullanın.

Başlangıç kullanımı:

Kullanım amacı ve/veya kullanılacak döneme göre:

Günde 3x5-10 ml kullanınız.

Devam kullanımı:

Günde 3x3 ml kullanınız.

Koruyucu kullanım:

Günde 3x1.5 ml kullanınız.

Kullanımı şekli:

- ✓ Günde 3 defa aç karnına kullanılır (8 saatte bir 5-10 mililitre). Süre aksatılmamalıdır.
- ✓ Şişeden alırken metalle temas ettirilmemelidir.
- ✓ Ölçek olarak kutu içeriğindeki ölçekli pipet kullanılabilir. Şişeden Enjektörle çekilecekse, enjektörün metal iğnesi çıkarılmalıdır.
- ✓ Her kullanımda ürün, 1 çay bardağı su ile seyreltilerek (Suya karıştırılarak) kullanılabilir.
- ✓ Ürün kullanımını takip eden 1 saat boyunca herhangi bir şey yiyip içilmemelidir.
- ✓ Ürün kullanıldığı sürece mümkün mertebe süt içilmemelidir. Süt ürünleri (Yoğurt, peynir vb.) tüketilebilir.
- ✓ Bitkisel içerikli ürünlerle birlikte kullanılmamalıdır.
- ✓ Kullanıma ara verilmemesi önerilir.

Yan etkileri:

- Geçici ishal veya kabızlık yapabilir.
- Gaita (Büyük abdest) renginde koyulaşma (Kullanım süresince devam edebilir).
- Sulandırılmadan içildiğinde dişlerde kararma yapabilir (Fırçalama ile geçecektir).

