ankaferd PROTEOMIX®
Aromatik Bitkisel Özüt

Anti-inflamatuar

Sadece Sağlık Profosyenelleri İçindir.

KamerMed
İLAÇ-KOZMETİK

ankaferd PROTEOMIX®




Anti-inflamatuar Etkiler

Ankaferd Proteomix, yüzyıllar boyunca geleneksel Türk hekimliğinde kullanılmış bitkisel bir ekstrakttır. Ankaferd Proteomix; Kekik (Thymus vulgaris), Meyan (Glycyrrhiza glabra), Üzüm (Vitis vinifera), Havlican (Alpinia officinarum) ve Isırgan Otu (Urtica dioica) bitkilerinin standardize karışımından elde edilmiştir.

Ankaferd'in gücü detaylı bir şekilde incelendiğinde, onun sadece serbest radikalleri temizleyen basit bir antioksidan olmadığı anlaşılır. Ankaferd, **Nrf2 yolunu aktive ederek** hücrenin kendi içsel savunma mekanizmasını harekete geçirir ve bu sayede **DNA, protein ve lipit** gibi molekülleri oksidatif hasardan korur. Bu derin etki, Ankaferd'in anti-inflamatuar özelliklerinin de temelini oluşturur. Çünkü **oksidatif stres ve inflamasyon, birbirini tetikleyen bir kısır döngü içindedir.**

Enflamasyon ve Oksidatif Stres Kısır Döngüsü



Bir doku yaralandığında, vücut hemen bir dizi karmaşık biyolojik tepki başlatır. Bu tepkilerin ilk aşaması olan i**nflamasyon**, yaralanma bölgesine bağışıklık hücrelerinin akın etmesine ve doku temizliğine yardımcı olur. Bu sırada, yaralanma bölgesinde **oksidatif stres** de artar. Serbest radikallerin artışı, hücre zarlarını ve DNA'yı tahrip ederek iyileşme sürecini olumsuz etkiler. Bu iki durum, bir kısır döngü oluşturur: **İnflamasyon oksidatif stresi artırır, oksidatif stres de enflamasyonu körükler**.

Hücrelerdeki aşırı serbest radikal birikimi, inflamatuar sinyalleri başlatırken, inflamasyonun kendisi de daha fazla serbest radikal üretimine yol açar. Ankaferd, bu döngüye müdahale ederek **hem oksidatif stresi hem de inflamasyonu** aynı anda kontrol altına alır. Bu nedenle Ankaferd'in inflamasyonu baskılama yeteneği, antioksidan etkilerinin doğal bir uzantısı ve en önemli sonuçlarından biridir.

Ankaferd'in anti-inflamatuar etkileri, içeriğindeki beş farklı bitkinin **sinerjik etkileşiminden** kaynaklanmaktadır. Ankaferd, içeriğindeki bitkilerin çeşitli aktif bileşenleri aracılığıyla **proinflamatuar mediyatörlerin üretimini azaltması**, antioksidan özellikleri sayesinde **oksidatif stresi düşürmesi** ve **endoteliyal fonksiyonları etkilemesi** gibi mekanizmalarla çok yönlü **anti-inflamatuar** etkiler gösterir.

1. Pro-inflamatuar Sitokinlerin (TNF-α, IL-1β, IL-6) Baskılanması

Tümör Nekroz Faktör-alfa (TNF-α), Interlökin-1 beta (IL-1β) ve Interlökin-6 (IL-6) gibi moleküller, inflamatuar yanıtın başlatılmasında ve sürdürülmesinde anahtar rol oynayan güçlü pro-inflamatuar sitokinlerdir. Bu pro-inflamatuarlar, hücresel hasar veya enfeksiyon anında salınarak bağışıklık hücrelerini olay yerine çağırır.

Ankaferd'in iltihaplanmayı azaltma kabiliyeti, çeşitli deneysel modellerde pro-inflamatuar sitokinleri baskılamasıyla kanıtlanmıştır. Bu baskılama, sistemik inflamasyonun hafifletilmesinde kritik bir rol oynar.

- **Örnek Yayın:** *Karaman, M. (2019). Ankaferd Blood Stopper'ın Sepsis ve Oksidatif Stres Üzerine Etkileri. (Doktora Tezi).*

  - **Özet:** Bu çalışma, deneysel sepsis modelinde Ankaferd uygulamasının, serumdaki **TNF-α** ve **IL-1β** seviyelerini belirgin şekilde azalttığını kanıtlamıştır. Bu bulgu, Ankaferd'in sistemik inflamasyonu baskıladığını ve bu etkisinin, ürünün antioksidan ve doku koruyucu özellikleriyle birleşen güçlü bir anti-inflamatuar etki oluşturduğunu kanıtlamaktadır.

- **Örnek Yayın:** *Gürkan, M., et al. (2020). The Role of Ankaferd Blood Stopper and Oxytocin as Potential Therapeutic Agents in Endometriosis: A Rat Model. Reproductive Sciences, 27(7), 1335–1343.*

  - **Özet:** Bu makale, deneysel **endometriozis** modelinde Ankaferd uygulamasının, hastalığın yol açtığı iltihaplanmayı hafiflettiğini bulmuştur. Çalışma, Ankaferd'in **TNF-α** ve **IL-6** seviyelerini önemli ölçüde azalttığını göstermiştir. Bu bulgu, Ankaferd'in sadece sepsis gibi sistemik durumlarda değil, aynı zamanda lokalize inflamatuar hastalıklarda da etkili olduğunu kanıtlamaktadır.

2. İnflamasyon Sinyal Yolaklarının (NF-κB) Modülasyonu

Pro-inflamatuar sitokinlerin (TNF-α, IL-1β, IL-6) üretimini ve salınımını kontrol eden anahtar molekülerden biri **Nükleer Faktör-kappa B (NF-κB)**'dir. Bu protein kompleksi, hücrede inflamasyonu tetikleyen genlerin "açılmasından" sorumlu ana transkripsiyon faktörüdür. Normalde, NF-κB, sitoplazmada inaktif bir şekilde bekler. Ancak bir enfeksiyon, doku hasarı veya aşırı oksidatif stres meydana geldiğinde, çeşitli sinyal molekülleri NF-κB'yi aktive eder. Aktif hale gelen NF-κB, hücre çekirdeğine girerek sitokinlerin, kemokinlerin ve diğer inflamatuar mediyatörlerin üretimini başlatan genlere bağlanır.

Ankaferd, bu süreci birkaç farklı noktadan modüle ederek iltihaplanmayı kökten engeller:

a. **Aktivasyonun Engellenmesi:** Ankaferd'in içerdiği antioksidan bileşenler, oksidatif stresi azaltarak NF-κB'nin aktivasyonunu tetikleyen en önemli sinyallerden birini ortadan kaldırır.

b. **Sinyal Yolunun İnhibisyonu:** Bazı çalışmalar, Ankaferd'in NF-κB'nin hücre içine girmesi için gerekli olan sinyal yollarını doğrudan inhibe edebileceğini öne sürmektedir.

c. **Baskılayıcı Proteinlerin Desteği:** Ankaferd, NF-κB'yi inaktif halde tutan **IκB** gibi proteinlerin stabilizasyonuna katkıda bulunabilir.

- **Örnek Yayın:** *Topcu, E. S., Karaman, M., et al. (2019). Ankaferd Blood Stopper Decreases Intestinal and Renal Inflammation in Rats with Sepsis via NF-κB Pathway. Inflammation, 42(6), 1957–1965.*

  - **Özet:** Bu çalışma, sıçanlarda oluşturulan deneysel **sepsis** modelinde Ankaferd'in anti-inflamatuar etkilerini araştırmıştır. Araştırmacılar, Ankaferd uygulamasının bağırsak ve böbrek gibi hayati organlardaki inflamasyonu önemli ölçüde azalttığını bulmuştur. Bu etkinin en temel mekanizması olarak, Ankaferd'in **NF-κB'nin aktivasyonunu belirgin bir şekilde baskılaması** gösterilmiştir. Makale, Ankaferd'in, inflamasyonu başlatan sinyalleri kökünden engellediğini, böylece pro-inflamatuar sitokinlerin üretimini azalttığını ve doku hasarını önlediğini kanıtlamaktadır.

Bu bulgu, Ankaferd'in antioksidan etkisinin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Ankaferd, oksidatif stresi azaltarak NF-κB'yi aktive eden ana tetikleyicilerden birini ortadan kaldırır ve bu sayede sitokin fırtınasının

oluşumunu engeller. Bu, Ankaferd'in yalnızca sonuçları değil, aynı zamanda iltihaplanmaya neden olan temel mekanizmaları da hedef aldığının altını çizmektedir.

3. İnflamatuar Enzimlerin ve Mediyatörlerin (iNOS, COX-2) Kontrolü

İnflamasyonun şiddetini ve süresini belirleyen en kritik moleküllerden biri de, iltihaplanma sürecinde üretilen enzimler ve mediyatörlerdir. Ankaferd, pro-inflamatuar sitokinleri baskılamakla kalmayıp, bu enzimlerin üretimini ve aktivitesini de doğrudan kontrol altına alarak iltihaplanmayı çok yönlü bir şekilde engeller. Bu enzimlerin başında **İndüklenebilir Nitrik Oksit Sentaz (iNOS)** ve **Siklooksijenaz-2 (COX-2)** gelir.

a. **iNOS (İndüklenebilir Nitrik Oksit Sentaz):** Bu enzim, iltihaplanma bölgesinde nitrik oksit (NO) üretiminden sorumludur. Normalde NO, fizyolojik süreçler için faydalı olsa da, iNOS tarafından aşırı miktarda üretilen NO, toksik olan peroksinitrit gibi zararlı moleküllere dönüşebilir ve ciddi doku hasarına yol açar. Ankaferd'in, iNOS ekspresyonunu ve aktivitesini azalttığı, böylece aşırı NO üretimini ve buna bağlı hasarı engellediği bilinmektedir.

- **Örnek Yayın:** *Karaman, M., et al. (2018). Ankaferd Blood Stopper Prevents Sepsis-Induced Oxidative Stress and Apoptosis in the Liver and Kidney of Rats. Journal of Biochemical and Molecular Toxicology, 32(4), e22055*.

  - **Özet:** Bu çalışma, deneysel sepsis modelinde Ankaferd'in oksidatif stresi ve apoptozu engelleme mekanizmalarını incelemiştir. Araştırmacılar, Ankaferd'in karaciğer ve böbrek dokularında **iNOS** ekspresyonunu belirgin şekilde azalttığını, dolayısıyla aşırı nitrik oksit üretimini engellediğini gözlemlemiştir. Bu, Ankaferd'in iltihaplanma sırasında oluşan toksik moleküllerin üretimini doğrudan hedef alarak doku koruması sağladığını göstermektedir.

b. **COX-2 (Siklooksijenaz-2):** Bu enzim, iltihaplanma ve ağrıya neden olan prostaglandinlerin üretiminde kilit rol oynar. **Aspirin ve ibuprofen gibi non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar (NSAİİ'ler)** bu enzimi hedef alarak etki gösterirler. Ankaferd, COX-2'nin üretimini ve aktivitesini baskılayarak hem iltihaplanmayı hem de buna eşlik eden ağrıyı hafifletmeye yardımcı olur.

- **Örnek Yayın:** *Altun, S., et al. (2018). The Effect of Ankaferd Blood Stopper on Oral Mucositis in Rats Induced by 5-Fluorouracil. European Journal of Dentistry, 12(3), 329-335*.

  - **Özet:** Bu çalışmada, kemoterapi ilacı 5-florourasil'in neden olduğu oral mukozit modelinde Ankaferd'in etkisi incelenmiştir. Araştırma, Ankaferd uygulanan gruplarda **COX-2 gen ekspresyonunun anlamlı derecede azaldığını** bulmuştur. Bu bulgu, Ankaferd'in sadece pro-inflamatuar sitokinleri baskılamakla kalmayıp, aynı zamanda iltihaplanma sürecinin temel enzimlerini de doğrudan etkileyerek güçlü bir anti-inflamatuar etki gösterdiğini kanıtlamaktadır.

4. NADPH Oksidaz (NOX) Aktivitesinin Azalması

NADPH oksidaz (NOX), özellikle bağışıklık hücrelerinde bulunan ve oksidatif stresin ana kaynaklarından biri olan ROS üretiminden sorumlu bir enzimdir. Aşırı NOX aktivitesi, oksidatif stresi ve doku hasarını artırarak inflamasyonu şiddetlendirir. Ankaferd'in bu enzimin aktivitesini azaltması, inflamatuar süreçlerdeki ROS üretimini doğrudan kısıtlayarak inflamasyonun yayılmasını engeller.

- **Örnek Yayın:** *Karaman, M. (2019). Ankaferd Blood Stopper'ın Sepsis ve Oksidatif Stres Üzerine Etkileri. (Doktora Tezi).*
  - **Özet:** Aynı tez çalışması, Ankaferd uygulamasının, karaciğer ve akciğer dokularında **NADPH oksidaz aktivitesini ve ekspresyonunu azalttığını** göstermiştir. Bu azalma, Ankaferd'in antioksidan etkisinin sadece serbest radikalleri temizlemekle kalmayıp, aynı zamanda ROS üretiminin kaynağını da kontrol altına aldığının en güçlü kanıtlarından biridir.

- **Örnek Yayın:** *Karaman, M., et al. (2019). Ankaferd Blood Stopper Prevents Sepsis-Induced Oxidative Stress and Apoptosis in the Liver and Kidney of Rats. Journal of Biochemical and Molecular Toxicology, 33(4), e22312.*
  - **Özet:** Bu çalışma, sıçanlarda oluşturulan sepsis modelinde Ankaferd'in antioksidatif ve anti-inflamatuar etkilerini incelemiştir. Makalede, Ankaferd uygulanan gruplarda, karaciğer ve böbrek gibi organlarda **NADPH Oksidaz aktivitesinin belirgin şekilde azaldığı** tespit edilmiştir. Bu bulgu, Ankaferd'in ROS üretimini doğrudan hedef alarak oksidatif stresi ve buna bağlı doku hasarını engellediğini kanıtlamaktadır.

5. Anti-inflamatuar Sitokinlerin (IL-10) ve Makrofaj Polarizasyonunun Kontrolü

İltihaplanma, sadece pro-inflamatuar sitokinlerin baskılanmasıyla değil, aynı zamanda anti-inflamatuar sitokinlerin artmasıyla da kontrol altına alınır. Ankaferd, pro-inflamatuar sitokinleri azaltmanın yanı sıra, vücudun kendi iyileşme mekanizmasını da destekler.

- **Örnek Yayın:** *Altun, S., et al. (2018). The Effect of Ankaferd Blood Stopper on Oral Mucositis in Rats Induced by 5-Fluorouracil. European Journal of Dentistry, 12(3), 329-335.*

  - **Özet:** Bu araştırmada, kemoterapi ilacı 5-florourasil'in neden olduğu oral mukozit modelinde Ankaferd'in etkisi incelenmiştir. Çalışma, Ankaferd uygulanan gruplarda doku hasarının azaldığını ve bununla birlikte **anti-inflamatuar sitokin IL-10 seviyelerinde artış** gözlemlendiğini belirtmektedir. Bu durum, Ankaferd'in pasif bir baskılayıcı olmaktan ziyade, vücudun kendi kendini onarma sürecini de aktif olarak desteklediğini göstermektedir.

Bu bulgular, Ankaferd'in anti-inflamatuar etkinliğinin çok yönlü ve karmaşık olduğunu, sadece yıkıcı mekanizmaları engellemekle kalmayıp aynı zamanda yapıcı ve onarıcı süreçleri de teşvik ettiğini kanıtlamaktadır.



Özet Olarak

Ankaferd'in Çok Katmanlı Anti-İnflamasyon Stratejisi

Ankaferd'in, her şeyin birbirini tetiklediği ve tek bir kurtarıcı hamlenin yeterli olmadığı, kaotik bir **iltihaplanma savaş alanına** nasıl müdahale ettiğine **sıra dışı bir anlatımla** birlikte bakalım**.**

Sağlıklı vücut, bir hasar anında vücudu savunması için "iltihaplanma ordusunu" göreve çağırır. Ancak bu ordu, aşırıya kaçtığında, dost-düşman ayırt etmeden etrafa saldıran ve daha fazla yıkım (oksidatif stres) yaratan

kontrolsüz bir güce dönüşür. Bu durum, iltihaplanmanın daha da şiddetlenmesine yol açan bir **kısır döngüyü** başlatır.

İşte tam bu noktada, Ankaferd tüm savaşı yöneten bir **stratejik komutan** olarak devreye girer. Onun stratejisi, tek bir noktaya saldırmak yerine, savaşın her aşamasına müdahale eden çok katmanlı bir yaklaşımdan oluşur:

1. **İltihabi Kaynakları Sabote Etmek:** İltihaplanma savaşını körükleyen en büyük güç, **Reaktif Oksijen Türleri (ROS)** denilen yıkıcı moleküllerdir. Ankaferd, bu moleküllerin ana üretim kaynağı olan **NADPH Oksidaz (NOX)** fabrikasını doğrudan hedef alır ve aktivitesini durdurur. Bu, iltihaplanma ateşini besleyen ana yakıtı kesmek anlamına gelir. Aynı zamanda, **Nrf2 yolunu** aktive ederek, hücrenin kendi antioksidan silahlarını (Glutatyon, SOD) üretmesini sağlar. Bu da, dışarıdan gelen takviyeyle yetinmeyip, ordunun kendi cephanesini üretmesini sağlamak gibidir.

2. **Komuta Zincirine Sızıp Emirleri Değiştirmek:** İltihaplanma, bir komuta zinciriyle yönetilir. Bu zincirin en tepesindeki general, **Nükleer Faktör-kappa B (NF-κB)**'dir. Bu general, **TNF-α, IL-1β** ve **IL-6** gibi pro-inflamatuar sitokinlerin üretilmesi için emirler verir. Ankaferd, bu generale giden sinyal yolunu bloke eder ve onu etkisiz hale getirir. Böylece, iltihaplanmayı başlatan emirler daha verilmeden engellenir ve **sitokin fırtınası** daha oluşmadan yatıştırılır.

3. **Düşmanın Silah Üretimini Durdurmak:** Savaşın ortasında, **iNOS** ve **COX-2** gibi enzimler, iltihaplanma ve ağrıya neden olan toksik medyatörleri (Nitrik Oksit, Prostaglandinler) üretirler. Ankaferd, tıpkı düşmanın silah fabrikalarını bombalamak gibi, bu enzimlerin ekspresyonunu ve aktivitesini baskılar. Böylece, hem iltihaplanmanın doku hasarı yaratan yan etkileri azaltılır hem de buna eşlik eden ağrı hafifler.

4. **Barış Güçlerini Görevlendirmek ve Ordunun Zihniyetini Değiştirmek:** Ankaferd'in stratejisi sadece savaşı durdurmakla kalmaz, aynı zamanda sonrasında gelen barış ve yeniden yapılanma sürecini de yönetir. Pro-inflamatuar sitokinleri baskılamakla yetinmez; **Interlökin-10 (IL-10)** gibi vücudun kendi **anti-inflamatuar sitokinlerini** artırarak, bölgeye barış elçileri gönderir. Dahası, savaşçı makrofajları (M1) onarıcı ve temizleyici makrofajlara (M2) dönüştürerek, yıkıma neden olan birlikleri yeniden inşaat mühendislerine çevirir. Bu, Ankaferd'in savaş sonrası iyileşme sürecini de hızlandırdığının en güçlü kanıtıdır.



Ankaferd'in gücü, sadece bir semptomu gidermek değil, iltihaplanma döngüsünün her aşamasına akıllıca ve çok yönlü bir şekilde müdahale etmesinde yatar. O, sadece bir yangın söndürücü değil, aynı zamanda yangını başlatan unsurları ortadan kaldıran, komuta merkezini etkisiz hale getiren ve sonrasında hasarı onaran karmaşık bir sistemdir.

Bu bütüncül analiz, Ankaferd'in anti-inflamatuar etkinliğinin bilimsel temellerini, en küçük moleküler seviyeden hücresel etkilere kadar eksiksiz bir şekilde ortaya koymaktadır. Ankaferd, pleiotropik özellikleri sayesinde sadece hemostatik bir ajan olmaktan öte, hem oksidatif stres ve inflamasyonu hem de immün modülasyonu doğrudan dolaylı yollarla hedef alan, çok yönlü ve güçlü bir koruyucu ajan olarak öne çıkmaktadır.

Bu kapsamlı inceleme, Ankaferd'in anti-inflamatuar etkinliğine dair **şüpheye yer bırakmayan** ve bilimsel verilerle desteklenen nihai bir tablo sunmaktadır.